APIXABAN ZYDUS (apixaban)
Carte patient

Cette carte doit être conservée avec vous/l'enfant/l'aidant en permanence.
Présentez cette carte au pharmacien, au dentiste et à tout autre professionnel de santé avant tout traitement.
Je suis sous traitement anticoagulant avec APIXABAN ZYDUS (apixaban) pour prévenir la formation de caillots sanguins.
Veuillez compléter cette section ou demander à votre médecin de le faire.

Nom : .....
Date de naissance : .....
Indication : .....
Dose : ..... mg deux fois par jour
Nom du médecin : .....
N° de téléphone du médecin : .....

Information destinée aux patients/aidants

- Prenez/donnez APIXABAN ZYDUS à heures fixes, comme indiqué. Si vous oubliez une dose le matin, prenez/donnez-la dès que vous vous en apercevez et elle peut être prise/donnée en même temps que la dose du soir. Une dose oubliée le soir ne peut être prise/donnée qu'au cours de la même soirée. Ne prenez/donnez pas deux doses le lendemain matin, mais au contraire continuez de suivre le lendemain le schéma posologique habituel à deux fois par jour conformément à la prescription.
- N'arrêtez pas de prendre/ donner APIXABAN ZYDUS sans en avoir parlé au médecin car vous (ou le patient) vous exposez à un risque d'accident vasculaire cérébral, de formation d'un caillot sanguin ou d'autres complications.
- APIXABAN ZYDUS aide à fluidifier le sang. Cependant, cela peut augmenter le risque de saignement.
- Les signes et les symptômes de saignement incluent des ecchymoses ou des saignements sous la peau, des selles noires, du sang dans les urines, des saignements du nez, des sensations vertigineuses, de la fatigue, pâleur ou faiblesse, maux de tête intenses et soudains, crachat de sang ou vomissement de sang.
- Si le saignement ne s'arrête pas de lui-même, **demandez immédiatement un avis médical**.
- En cas de chirurgie ou d'une quelconque procédure invasive, informez votre médecin que vous prenez/que le patient prend APIXABAN ZYDUS.

Information destinée aux professionnels de santé

- APIXABAN ZYDUS (apixaban) est un anticoagulant oral agissant par inhibition directe et sélective du facteur Xa.
- APIXABAN ZYDUS peut augmenter le risque de saignement. En cas d'évènements hémorragiques majeurs, il doit être arrêté immédiatement.
- Le traitement par APIXABAN ZYDUS ne nécessite pas de surveillance de routine de l'exposition. Un test quantitatif calibré anti-Facteur Xa peut être utile dans des situations exceptionnelles, par exemple en cas de surdosage ou d'intervention chirurgicale d'urgence (les résultats des paramètres de la coagulation, temps de prothrombine (TP), rapport normalisé international (INR) et temps de céphaline activé (TCA) ne sont pas recommandés) - voir le RCP.
- Un agent permettant d'inverser l'activité anti-Facteur Xa d'apixaban est disponible chez les adultes. Toutefois, sa sécurité et son efficacité n'ont pas été établies chez les patients pédiatriques (consulter le résumé des caractéristiques du produit de l'andexanet alfa).

Version : 00

zydus